

Pastilhas desinfetantes - Hospitais

Bactericida, Fungicida, Virucida, Micobatericida e Esporicida.

Para desinfecção de locais de trabalho, utensílios, recipientes e equipamento em hospitais, maternidades, enfermarias, blocos operatórios e laboratórios. Uma solução desinfetante de longo espectro, de atuação rápida e eficaz contra bactérias vegetativas, fungos, vírus e esporos.

Estabilidade do produto: Perda de apenas 1% da riqueza por ano.

Contém dicloroisocianurato de sódio (CAS: 52580-86-0). Favorece a inflamação de matérias combustíveis. Nocivo por ingestão. Irritante para os olhos e vias respiratórias. Em contato com ácidos, liberta gases tóxicos. Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Em conformidade com (EN 1327, 13697, EN 13624, 13697, EN 14476, EN 14348, EN 13704, 17126); Concentração NaDCC superior a 1,65 g.

Atenção: H272 Pode agravar incêndios; comburente. H302 Nocivo por ingestão. H319 Provoca irritação ocular grave. H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias. EUH031 Em contacto com ácidos liberta gases tóxicos. H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. EUH206 Atenção! Não utilizar juntamente com outros produtos. Podem libertar-se gases perigosos (cloro). P102 Manter fora do alcance das crianças. P402 + P404 Armazenar em local seco. Armazenar em recipiente fechado. P305 + P351 + P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P337 + P313 Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. P260 Não respirar os fumos.

FABRICADO POR:
Orache Desinfection S.L.
DISTRIBUÍDO POR:



Rua Dr. José Lopes N.º3
5300-416 Bragança, Portugal
T.: +351 273 331 268

www.nordhigiene.pt



ATENÇÃO

MedChlor

Pastilhas desinfetantes

150 PASTILHAS

Elimina a maioria dos
germes e bactérias



Desinfetante de amplo espectro, uma ação imediata.

Como usar: Pode ser usada no manual lavagem, pulverização, imersão ou lavar regularmente com espanador.

Para desinfecção de superfície de trabalho, utensílios, copos e equipamentos na maternidade, enfermaria, salas cirúrgicas e laboratórios, bem como para a desinfecção de hospital em geral: comprimidos para oferecer uma solução desinfetante no espectro, de ação rápida, eficaz contra bactérias vegetativas, fungos, vírus e esporos bacterianos.

Para preparar uma solução desinfetante, consulte a tabela de soluções:

Tabela para dissolução de pastilhas desinfetantes		
Desinfecção de:	Necessária a concentração de cloro	Taxas de dissolução para pastilhas de 3,35 gr.
Derramamento de sangue	10.000 ppm	11 pastilhas em 1 litro de água
Recipientes de pipeta	2.500 ppm	7 pastilhas em 2,5 litros de água
Uso em um laboratório / ambiente geral	1.000 ppm	2 pastilhas em 5 litros de água
Garrafas/tetos, utensílios de aço inoxidável, frascos de vidro, porcelana, tubos de plástico e borracha	140 ppm	2 pastilhas em 10 litros de água
Louças e talheres	140 ppm	2 pastilhas em 10 litros de água
Roupas sujas ou infectadas	140 ppm	2 pastilhas em 10 litros de água
Mesas de trabalho	140 ppm	2 pastilhas em 10 litros de água
Pisos, esfregões, etc	60 ppm	2 pastilhas em 23 litros de água

Número de lote e data de Validade: ver embalagem.

150 x 3,35 g = 500 gr.



UFI: FD10-00C5-1002-ERWW

